

Waarom U koorts niét moet onderdrukken!

Koorts en het gevaar van Paracetamol?

Koorts is heel vaak een antwoord van ons lichaam op een bacteriële of virale infectie ergens in het lijf, of een reactie op een verstoring van het interne biologisch evenwicht. Meteen grijpen naar een koortsonderdrukker zoals Paracetamol is dus eigenlijk niet zo verstandig, beter zou zijn om het lichaam te ondersteunen met zijn “Vis Medicatrix” (=zelfgenezingstendens). Het lichaam heeft de oplossing zelf bedacht: koorts als therapie om de aanvallende te “killen” .

Uit onderzoek blijkt Paracetamol schadelijk te zijn in hoge en in langdurige doseringen:

Mensen die regelmatig paracetamol innemen, omdat zij last hebben van migraine of chronische hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn of hoofdpijn veroorzaakt door geneesmiddelen!!!!) nemen dan toch dikwijls paracetamol.

Teveel patiënten nemen te hoge doseringen, omdat zij vinden dat de klacht snel over moet, d.w.z. zij zien hun klachten niet als signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is, neen zij verdoezelen hun onbalans door er nog een ziekte (geneesmiddelenziekte) over heen te leggen.

De ene ziekte overstemt namelijk de andere ziekte als je de nieuwe ziekte maar erg genoeg maakt..

U zou het zo kunnen formuleren: de oorspronkelijke natuurlijke ziekte wordt overstemt door de opgelegde geneesmiddelenziekte.

Dit bovengenoemde principe dat is hét grote kenmerk van de handelswijze en denkwereld van de allopathie (regulier geneeskunde). Het is in de allopathie dus bijna altijd onderdrukkende therapie soms suppletie (aanvullend als er ergens een tekort aan is). Deze onderdrukkende therapie geneest als het er op aan komt natuurlijk niets maar geeft slechts de schijn van tijdelijke verbetering.

Veel mensen zijn hier tevreden mee.

Mensen die op korte tijd 20 tabletten paracetamol innemen, vergiftigen hun lever (onze grootste lichaamseigen ontgiftingsfabriek legt U dus plat). Ze zetten een niet omkeerbaar proces in gang dat de lever langzaam beschadigt. Deze leverbeschadiging gaat gepaard met heel veel pijn waar niets tegen te doen valt. Behalve eventueel weer pijnstillers te nemen, dus nog meer vergiftiging. Deze pijn houdt afhankelijk van de lichamelijke gezondheid 4-6 weken aan. Daarna volgt onherroepelijk de dood.

De eerste symptomen van een paracetamolvergiftiging zijn anorexie (slechte eetlust met extreme vermagering), misselijkheid en braken. Een hoeveelheid van 6 gram (12 tabletten van 500 milligram) paracetamol kan reeds leverbeschadiging geven, grotere hoeveelheden veroorzaken onherroepelijke levercirrhose (verlittekening) of necrose (het afsterven van de lever).

Mensen die paracetamol gebruiken om hoofdpijnen te onderdrukken mogen per etmaal niet meer dan 4 gram gebruiken (8x 500 mg).

